

RESONANCIA MAGNETICA

Paciente: **JOSE ANGEL ALVARADO GONZALEZ**
Edad: **26 años** Sexo: **Masculino**
Fecha: **03/12/2025**

Hoja 1 de 2

Dirigido a: **ARMANDO MENCHACA BARRAGAN**

Apreciado(a) Dr.(a): **ARMANDO MENCHACA BARRAGAN**

A continuación le presento el informe del estudio que le ha solicitado a su paciente.

TOBILLO ^ RUTINA

Técnica: Se realizó estudio de Resonancia Magnética empleando escáner de 1.5 Tesla, y protocolo estandarizado del centro. Las imágenes se obtuvieron de la región de Tobillo derecho

Hallazgos:

Señal de la médula ósea: adecuada señal en las estructuras óseas valoradas.

Estructuras óseas: edema / contusión ósea a nivel del maléolo externo. Entesofito hacia el sitio de inserción del tendón de Aquiles. Edema óseo en margen medial del astrágalo.

Espacios articulares: Distensión posterior a nivel tibioastragalina y subastragalina.

Ligamentos: aumento de señal y pérdida de definición del ligamento peroneoastragalino anterior compatible con rotura completa. El ligamento peroneocalcáneo muestra aumento de señal y de volumen hacia las fibras distales. ligamento peroneoastragalino posterior con aumento leve de señal. Ligamento tibioastragalino anterior muestra incremento en la señal. Aumento leve de la señal del ligamento sindesmótico tibioastragalino anterior.

Músculos y tendones: aumento de señal de tendones peroneo corto así como del tendón tibial posterior . Distensión leve de la vaina del tendón peroneo largo, flexor largo del hallux y tibial posterior. Tendón de Aquiles con incremento leve en la señal de las fibras a nivel distal.

Gracias por su preferencia.

RESONANCIA MAGNETICA

Paciente: **JOSE ANGEL ALVARADO GONZALEZ**
Edad: **26 años** Sexo: **Masculino**
Fecha: **03/12/2025**

Hoja 2 de 2

Dirigido a: **ARMANDO MENCHACA BARRAGAN**

Tejidos blandos: aumento de la señal de los tejidos blandos hacia la región lateral del tobillo. Aumento de señal de la fascia plantar.

Otros hallazgos: sin otros hallazgos que destacar.

Conclusión:

Rotura completa del ligamento peroneoastragalino anterior, grado III

Rotura parcial del ligamento peroneocalcáneo y del ligamento tibioastragalino anterior, grado II

Lesión grado I del ligamento sindesmótico tibioperoneo anterior.

Derrame sinovial subastragalino y tibioastragalina posterior.

Contusiones óseas a nivel peroneo así como astragalino medial.

Tendinopatía distal del tibial posterior y del peroneo corto.

Tenosinovitis del peroneo largo y de los flexores.

Sugerencia: Valoración por médico tratante.

Atentamente,



Dr. Edgar Luna Villanueva
Médico Radiólogo Certificado
Ced. Prof. 8387204
Ced. Esp. 11272651

Gracias por su preferencia.